OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule : 2 fr.)

12,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOL.
CAMBRIDGE, MASS.

DOUZIÈME FASCICULE

(20 janvier 1915)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1915

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

INTRODUCTION

Dans l'introduction du dernier fascicule paru, j'ai cru de mon devoir, en guise de légitime protestation à un étrange et arrogant manifeste, de publier une phrase qu'il convient de répéter ici :

« Décrire de nombreuses nouveautés d'une collection française dans une publication française : Voilà la riposte d'un entomologiste ayant des idées larges à l'orgueilleuse et étroite *Kultur* scientifique. »

Cette réponse à un indigeste et inhabile plaidoyer, en faveur de la destruction systématique de monuments historiques ou de l'incendie commandé de bibliothèques respectables, n'a pas été, je crois, trop méchante.

Dans sa modération, et surtout sa brièveté voulue, peut-être n'a-t-elle pas eu la portée suffisante pour atteindre les penseurs qui réservent leur admiration uniquement à ce qui est long ou épais ? Alors, je vais me permettre de revenir à la charge. En exprimant quelques idées posées et réfléchies, serai-je finalement compris ? J'ose l'espérer, tout au moins je me permets de le souhaiter.

La langue trop vivante qui a pu commander l'incendie de l'Université de Louvain, le bombardement de la cathédrale de Reims ou des merveilles historiques de Flandre, n'est pas digne de parler au monde savant et le latin, langue morte, incontestablement scientifique, doit lui être substitué.

Voilà ce qu'il faudra demander, ou exiger partout, dans l'avenir, l'imposant au besoin par une loi. Les cerveaux *kolossalement* bourrés de savoir m'ont-ils enfin compris ?

J'élargis ma pensée, je généralise la loi pour la rendre absolument acceptable. Une proposition de mon ami re-

gretté E. Olivier (1), présentée au Congrès d'Oxford, où elle a reçu un très bon accueil, peut donner satisfaction à tous les savants du monde entier, il suffirait donc de l'appliquer sans exception à toute publication, et ainsi aucune objection ne saurait être faite contre la légitimité d'un ostracisme généralisé. D'ailleurs, personne ne peut légitimement protester contre l'imposition du latin considéré comme langue vraiment scientifique. Ainsi, une diagnose latine devra précéder toute nouveauté, ou celle-ci sera considérée comme non avenue.

Et maintenant, je l'espère, aucun entomologiste n'ignorera plus le but raisonné de ma précédente publication descriptive et demi-latine.

Nota. — Toutes les nouveautés décrites dans le fascicule XII font partie de ma collection.

(1) « Nécessité de l'emploi du latin pour les descriptions », in vol. II, *Transactions International Congress of entomology*, p. 232.

DESCRIPTIONS ABRÉGÉES

DIVERSES

Trichodesma amasonica n. sp. Latus, niger, griseo pubescens, elytris nigro fasciculatis. Long. 5 mill. Amérique Méridionale : Amazones.

Très voisin de *T. Donckieri* Pic, mais la dent du prothorax est plus forte, les élytres sont uniformément et assez densément pubescents de gris avec quelques petits fascicules noirs.

Trichodesma maculata n. sp. Latus, niger, dense griseo aut fulvo pubescens, elytris ad medium et lateraliter brunneo maculatis. Long. 6 mill. ? Cambodge.

Ressemble à *T. lateritia* Pic par son dessin, mais le prothorax est plus gibbeux et très inégal, les élytres sont plus densément pubescents, ornés de longues soies dressées avec la macule foncée, à contours irréguliers, non glabre mais voilée de pubescence.

Trichodesma cambodgensis n. sp. Latus, niger, dense griseo aut luteo pubescens, elytris pro parte denudatis. Long. 6,5 mill. Cambodge.

Distinct de *T. regalis* Pic par les élytres non maculés et à ponctuation moins profonde, le prothorax relativement moins large et à peine fasciculé en dessus.

Xystrophorus tesselatus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, luteo pubescens, elytris irregulariter tesselatis, antennis rufescentibus. Long. 8 mill. Tonkin.

Diffère de *X. Mouhoti* Pic par l'aspect plus brillant, les élytres plus fortement et irrégulièrement ponctués, ornés de dessins jaunes non continus, en partie disposés en mouchetures.

Clada rugosa n. sp. Opacus, modice elongatus, rugo-

sus, rufus, antennis testaceis, flabellatis, scutello luteo. Long. 4 mill. Dahomey.

Très voisin de *C. antennata* Pic, en diffère par la forme un peu allongée, le prothorax moins arrondi sur les côtés et roux, les élytres rugueusement et moins distinctement ponctués.

Clada sublineata n. sp. Opacus, modice elongatus, nigro-piceus, luteo pubescens, elytris parum distincte luteo lineatis ; scutello albido. Long. 5 mill. ? Indes (ex coll. Castelnau).

Très distinct de *C. lineata* Pic par la forme plus étroite, les bandes jaunâtres et peu distinctes des élytres, la première étant sinuée, ainsi que par la suture non pubescente.

Clada siamensis n. sp. Subnitidus, modice elongatus, rufus, luteo pubescens, elytris parum distincte luteo lineatis, scutello albido. Long. 7 mill. Siam.

Plus robuste et plus clair que le précédent, avec le prothorax plus fortement gibbeux en arrière.

Scirtes Katanganus n. sp. Nitidus, oblongo-elongatus, postice attenuatus, nigro-piceus, thorace lateraliter, antennis pedibusque testaceis ; sat fortiter et parum dense punctatus. Long. 3 mill. Congo : Katanga.

A placer près de *S. fuscicrus* Fairm. et en différant par la coloration et la forme plus allongée.

Scirtes brunneiceps n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, postice attenuatus, rufo-testaceus, pedibus pallidioribus, capite brunnescente, antennis apice nigris ; sat fortiter et sparse punctatus. Long. 2,8 mill. Congo.

Voisin du précédent, en outre de la coloration moins foncée, en diffère par la forme un peu ovalaire, l'écusson plus large.

Scirtes Lajoyei n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, convexus, pallido-testaceus, oculis nigris ; minute sat sparse punctatus. Long. 2 mill. Tonkin : Sept-Pagodes (ex coll. Lajoye).

Plus convexe et plus pâle sur le dessus du corps que *C. lividus* Pic, près duquel on peut le placer.

Scirtes boliviensis n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, subdepressus, nigro-piceus, thorace testaceo ; mediocre sat sparse punctatus. Long. 3 mill. Bolivie : Chaco.

Diffère de *S. testaceicollis* Pic par les élytres déprimés sur le disque et plus finement ponctués, les pattes foncées, etc.

Scirtes longipennis n. sp. Nitidus, elongatus, antice et postice attenuatus, rufus, elytris pro parte piceis ; sat fortiter et parum sparse punctatus. Long. 4-4,5 mill. Java.

Voisin de *S. unicolor* Pic, de forme encore plus allongée, plus parallèle au milieu, avec la ponctuation plus rapprochée sur le prothorax.

Scirtes diversepunctatus n. sp. Nitidus, oblongus, postice attenuatus, rufo-testaceus, antennis pedibusque anticis pallidioribus, oculis nigris, elytris granuloso-punctatis. Long. 2,5 mill. Ile Banguey.

Moins allongé et plus rétréci postérieurement que le précédent, avec la ponctuation élytrale différente, en partie granuleuse.

Scirtes Fouqueti n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, subdepressus, niger, fortiter sat sparse punctatus, elytris distincte marginatis. Long. 3-3,5 mill. Saïgon (Fouquet).

Diffère de *S. ovatulus* Lewis par la forme moins allongée et les élytres distinctement rebordés.

Scirtes Gounellei n. sp. Nitidus, ovalis, subconvexus, niger, capite, thorace, scutello geniculisque rufescentibus, elytris distincte marginatis. Long. 5 mill. Brésil : Caraça (Gounelle).

En outre de la coloration différente, plus grand et plus ovalaire que le précédent, avec la ponctuation du prothorax nettement plus fine que celle des élytres.

Scirtes sexmaculatus n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, subdepressus, antennis pedibusque testaceis, infra niger, supra luteo-testaceus, nigro maculatus, in elytris maculis

sex elongatis, in thorace macula postica circumflexa, capite postice scutelloque nigris. Long. 5 mill. Brésil : Itatiaya (Gounelle).

Espèce très distincte par sa coloration, avec ses élytres ornés chacun de six macules noires allongées, disposées deux à deux : peut se placer près de *S. lineatus* Chevr.

Scirtes brevenotatus n. sp. Nitidus, oblongo-ovalis, depressus, infra pedibusque pro majore parte testaceis, supra nigro-piceus, elytris subcostulatis, breve testaceo maculatis. Long. 6 mill. Brésil : Mendès.

Espèce remarquable par sa grande taille, ses élytres costulés et ornés antérieurement, vers la base et sur les côtés, de petites macules testacées.

Scirtes laticollis n. sp. Nitidus, ovalis, subdepressus, rufescens, elytris nigro-piceis, ad humeros et ad apicem rufomaculatis. Long. 2 mill. Ile Banguey.

Cette petite espèce, qui peut prendre place près de *S. Le Moulti* Pic, est très distincte par sa forme ovalaire, déprimée jointe à sa coloration.

Scirtes rufonotatus n. sp. Nitidus, ovalis, subconvexus, nigro-piceus, antennis pedibusque pro parte testaceis, elytris lateraliter nigro-piceis, ad suturam rufo notatis ; elytris latis, lateraliter subcostulatis et depressis. Long. 4,5 mill. Formose.

Cette espèce, très distincte par sa forme jointe à sa coloration, doit prendre place près de *S. costulipennis* Fairm.

Elodes subacuminata n. sp. Nitidus, elongatus et angustatus, postice attenuatus et subacuminatus, testaceus, oculis griseis. Long. 5 mill. Madagascar.

Espèce très distincte par sa forme très allongée, avec les élytres subacuminés au sommet. Peut se placer près de *S. hydroporoides* Fairm.

Elodes rouilloni n. sp. Nitidus, elongatus, postice attenuatus, testaceus, capite postice thoraceque in disco brunnescentibus, elytris testaceis, ad suturam et lateraliter

nigro-piceis. Long. 4,5 mill. Madagascar. Reçu de Pouillon.

Très distinct du précédent, en outre de la coloration, par la forme non acuminée des élytres et celle plus large du prothorax.

Eubrianax longipennis n. sp. Nitidus, oblongo-elongatus, niger, thorace testaceo, in disco nigro notato. Long. 5 mill. Pérou : Rio-Mixiollo (G.-A. Baer.).

Distinct de toutes les espèces décrites par la forme plus allongée des élytres.

Eubrianax Dohertyi n. sp. Nitidus, oblongo-elongatus, postice dilatatus, testaceus, capite postice, scutello thoraceque in disco nigro-piceis, antennis nigris. Long. 4 mill. Bornéo : Martapura (Doherty).

De coloration plus claire et de forme plus allongée que *E. obscuripes* Pic, avec les élytres moins élargis en arrière.

Lycas Seillierei (1) n. sp. Nitidus, elongatus, postice attenuatus, luteo sat uniformiter pubescens, nigro-piceus, abdomine, elytris pedibusque pro parte rufescentibus ; thorace lateraliter sinuato, in disco mediocre impresso ; elytris elongatis, apice subacuminatis, lineato punctatis. Long. 19 mill. Himalaya (P. Bertrand).

Voisin de *L. sikkimensis* Pic, mais pubescence un peu jaunâtre (et non grise), moins fournie, troisième article des antennes moins large, etc.

Astylus chiriquensis (var. nov.). Nitidus, elongatus, niger, elytris longitudinaliter rubro trilineatis et bicostatis. Long. 10 mill. Panama : Chiriqui.

Variété de *A. vittatus* Gorh. caractérisée par les bandes discale et interne des élytres larges, complètes, réunies en avant.

.....

(1) Dédié à la mémoire de Gaston Seillière, de la collection duquel provient cette espèce, don aimable de la famille de ce jeune entomologiste regretté.

Astylus nigrofemoralis n. sp. Nitidus, satis latus, nigro-æneus, elytris antice luteo trilineatis et apice luteo maculatis, antennis, tibiis tarsisque testaceis. Long. 5 mill. Pérou.

Voisin de *A. pallipes* Kirsh., moins fortement ponctué sur les élytres, plus pubescent, avec les fémurs noirs.

Astylus Armitagei (var. nov.). Subnitidus, nigro-æneus, limbo thoracis, pedibus pro majore parte elytrisque testaceis, his in medio nigro bilineatis. Long. 5 mill. Brésil (ex coll. Armitage).

Variété de *A. jatahyensis* Pic, à plus grande extension de la coloration testacée sur les élytres.

Astylus minutus n. sp. Nitidus, viridi-metallicus, elytris signaturis luteis quatuor ornatis. Long. 6 mill. Amérique méridionale.

Ressemble à *A. Bang-Haasi* Pic, mais plus petit, macules et fascies jaunes au lieu d'être rougeâtres et fascie postmédiane nettement arquée.

Astylus Gorhami n. sp. Subnitidus, elongatus, nigro-subæneus, elytris antice in disco lateraliter rubro lineatis et ante apicem rubro maculatis. Long. 8 mill. Ile Saint-Vincent.

Très voisin de *A. antillarum* Gorh., en diffère par l'aspect moins brillant, les élytres plus fortement ponctués, le sommet de ces organes tronqué et non échancré, enfin par la présence, sur chaque élytre, d'une bande discale rouge (et non de macules isolées), à contours irréguliers.

Silis nitidocostata n. sp. Subnitidus, mediocre elongatus et satis brevis, niger, capite in medio thoraceque lateraliter et antice testaceo notatis, illo postice tuberculato et inciso ; elytris costatis ; antennis robustis. Long. 8 mill. Madagascar : Tananarive.

Voisin de *S. multicostata* Pic, plus robuste, moins brillant, les antennes plus épaisses et le prothorax de structure différente.

Silis nigronotaticollis n. sp. ♀. Opacus, elongatus, sub-

parallelus, niger, thorace testaceo, nigro quadrimaculato, transverso, lateraliter subarquato, postice mediocre inciso. Long. 10 mill. Madagascar.

A placer près de *S. mandibularis* Frm., dont il diffère au moins par le prothorax quadrimaculé de noir, la macule basale et médiane étant subcarrée, incisée en avant, la médiane antérieure subtriangulaire en arrière, les latérales petites.

Silis latithorax n. sp. ♂. Nitidus, parallelus, niger, antennis, pedibus elytrisque testaceis ; thorace lato, postice inciso et lobato aut spinoso. Long. 6 mill. Madagascar : Tananarive.

Cette petite espèce est caractérisée par son prothorax particulier, aussi large que les élytres, relevé sur les côtés antérieurs, à lobe postérieur teinté de roux, arqué et épineux au sommet. Peut se placer près de *S. armicollis* Fairm.

Silis obscuriventris (nouv.) ♀. Nitidus, subparallelus, testaceus, abdomine obscure, capite nigro, thorace antice nigro notato, illo lateraliter sinuato. Long. 6 mill. Madagascar.

Diffère du précédent, dont il n'est peut-être qu'une variété, par la coloration du prothorax en majeure partie testacée et cet organe un peu plus étroit que les élytres.

Silis nigromaculata n. sp. Opacus, satis elongatus, postice attenuatus, testaceus, antennis, palpis, mandibulis, oculis pedibusque pro parte nigris, thorace postice nigro quadri maculato, illo postice strangulato et medio impresso. Long. 12-13 mill. Madagascar : Tananarive.

Voisin de *S. madagascariensis* Wat., bien distinct par le prothorax non incisé postérieurement et quadrimaculé de noir, les tibias testacés, brièvement marqués de noir au sommet.

Nanophyes singularirostris n. sp. Nitidus, ovalis, sat sparse pubescens, rufus, capite thoraceque fuscis ; rostro ad basin dilatato ; elytris fortiter striato-punctatis. Long. 2,5 mill. Madagascar : Tananarive.

Cette espèce, distincte par la forme de son rostre, peut prendre place près de *N. pleuralis* Frm.

Nanophyes testaceicoxis n. sp. Nitidus, ovalis, sat sparse griseo pubescens, niger, antennis ad basin coxisque testaceis, elytris ad medium oblique albido fasciatis. Long. 2,5 mill. Madagascar.

A placer près de *N. Alluaudi* Pic, s'en distingue par la coloration des pattes et la bande blanche nette sur les élytres.

Nanophyes rufoapicalis n. sp. Nitidus, ovalis, sat sparse griseo pubescens, niger, antennis ad basin pedibusque pro majore parte testaceis, femoribus supra nigro maculatis, elytris apice rufo tinctis. Long. 2,5 mill. Madagascar.

Diffère du précédent, en outre de la coloration plus claire des pattes, par les élytres teintés de roux au sommet et dépourvus de bande blanche nette.

Ocladius madecassus n. sp. Opacus, oblongo-globosus, elytris postice et infra excavatis, niger, lateraliter pro parte rufo pubescens ; thorace lato, antice angustiore, foveis magnis impresso, in medio plicato ; elytris foveatis et tuberculis mediocris seriatim obsitis. Long. 5,5 mill. Madagascar : Mahatsinjo.

Paraît voisin de *O. granosus* Fairm. (ex-description) et en différer au moins par la forme et la sculpture des élytres.

Ocladius fasciculatus n. sp. Opacus, subglobosus, elytris tuberculatis et fasciculatis, niger, pro parte fulvo pubescens ; thorace lato, antice angustiore, dense et mediocre punctato ; elytris striato-punctatis, triseriatim et transverse tuberculis munitis. Long. 5 mill. Madagascar.

Espèce très distincte par ses trois rangées transversales de tubercules ou fascicules, pouvant prendre place près de *O. Alluaudi* Frm.

Prothema ochraceosignata n. sp. Opacus, rugoso-punctatus, niger, thorax lateraliter late et infra postice ochra-

ceo pubescens ; infra corpore griseo pubescens, antice lateraliter episternoque ochraceo notatis. Long. 14 mill. Formose.

Voisin de *P. funerea* Pascoe et distinct, à première vue, par le prothorax orné sur les côtés de pubescence ocracée.

Rhaphuma nigrolineata n. sp. Opacus, angustatus, niger, albo pubescens, antennis pedibusque testaceis, elytris testaceis, signaturis nigris ornatis : linea dorsalis antice semilunulata, postice ad fasciam subtransversam juncta, fascia ante apicem ; thorace elongato, postice strangulato ; elytris apice truncatis. Long. 12 mill. Thibet.

Voisin de *R. acutivittis* Kr. et distinct, à première vue, par la disposition en partie longitudinale des dessins noirs des élytres.

Rhaphuma testaceiceps n. sp. Subopacus, angustatus, rufo-testaceus, antennis pedibusque brunnescentibus, ad basin testaceis, scutello albo pubescente, thorace ad basin elytrisque ante apicem albo maculatis, infra corpore niger, albo pubescens ; antennis pedibusque longissimis ; elytris apice oblique subtruncatis. Long. 8 mill. Formose.

Paraît voisin de *R. sexnotata* Chevr., mais élytres sans macules noires, antennes plus longues que le corps.

Lissodema indicum n. sp. Nitidus, robustus, nigro-æneus, antennis ad basin pedibusque testaceis, elytris ad basin et ad apicem flavo bimaculatis ; capite thoraceque fortiter et sparse punctatis, illo 4 denticulato ; antennarum articulis 3 ultimis crassioribus ; elytris latis, postice attenuatis. Long. 2,3 mill. Indes : Madura.

Paraît voisin de *L. pictipenne* Lewis (ex-description), il en diffère au moins par le prothorax à ponctuation écartée et la coloration entièrement testacée des pattes.

Physcius atricollis n. sp. Nitidus, parum elongatus, niger, antennis pedibusque pro parte testaceis ; capite thoraceque densissime punctatis, illo breve, postice biimpresso ; elytris satis latis, postice dilatatis, irregulariter

punctatis. Long. 3 mill. République Argentine : Rio-Salado.

Voisin de *P. brasiliensis* Pic, avant-corps foncé et plus fortement ponctué, élytres un peu plus courts.

Physcius nigronotatus n. sp. Nitidus, parum elongatus, rufus, antennis pedibusque testaceis, elytris antice et lateraliter, ante apicem et ad suturam nigro notatis ; capite thoraceque mediocre sat sparse punctatis, illo breve, postice biimpresso ; elytris satis latis, ad medium dilatatis, sat dense punctatis. Long. 3,5 mill. Brésil : Rio Verde.

Voisin de *P. subdepressus* Pic, èlytres plus rétrécis à l'extrémité, à dessins différents, avec une longue bande latérale noire antérieure.

Stilponotus goyasensis n. sp. Nitidus, elongatus, antice et postice angustatus, nigro-metallicus, supra nigro-æneus, elytris aureo-purpureis, infra viridescens. Long. 6 mill. Brésil : Goyaz.

Distinct à première vue de *S. Thomsoni* Champ. par la coloration des élytres.

Cleteus grandis (Chatanay) n. sp. Subnitidus, latus, antice et postice attenuatus, elytris subconvexis, lineato-punctatis, niger, pro parte griseo pubescens, antennis apice rufescentibus. Long. 12 mill. Madagascar.

Distinct de *C. marginicollis* Frm. par la taille avantageuse et les élytres noirs, la pubescence disposée en mouchetures, etc.

Platynosum Chatanayi n. sp. Opacus, oblongus, niger, antennis tarsisque testaceis. Capite lato, in vertice tuberculato ; thorace robusto, postice attenuato, in disco inæquale et multo impresso ; elytris brevibus, tricostatis, intervallis mediocre plicatis aut impressis. Long. 3 mill. Congo : Kissabé.

Très distinct, à première vue, de *P. Paulinæ* Muls. par les élytres ayant chacun trois côtes très saillantes. Dédié à la mémoire de J. Chatanay, mort au champ d'honneur.

Gonocnemis angustatus n. sp. Subopacus, angustatus,

parallelus, rufescens, thorace subquadrato, antice et postice attenuato, in disco depresso ; elytris multi costatis, intervallis punctato-impressis. Long. 6 mill. Congo : Chari-Tchad.

Voisin de *G. sinuaticollis* Kolbe, plus étroit et de coloration plus claire.

Gonocnemis hispidus n. sp. Subnitidus, satis latus, rufo-brunneus, luteo pubescens et hispidus ; thorace subquadrato, postice attenuato, in disco antice biimpresso ; elytris latis, multicarinatis, intervallis punctato impressis. Long. 6-7 mill. Birmanie.

Voisin de *G. sericeus* F., prothorax plus étroit et pubescence plus longue.

Lycogonocnemis nov. genus. *Lemoultia* Chat. vicinus sed thorace carinato et areolato, elytris latis et carinatis facile distinguendus.

Par ses cuisses longues, paraissant inermes, le prothorax impressionné postérieurement sur les côtés, semble se rapprocher du genre *Lemoultia* Chat., dont il diffère par les caractères ci-dessus, surtout par la singulière sculpture du prothorax, celui-ci, plus étroit que les élytres, présente, comme certains *Lycides*, une aréole médiane en losange bordée de fortes carènes, flanquée sur le milieu, de chaque côté, d'une aréole subarrondie limitée par une arête circulaire, côtés plus faiblement carénés.

Lycogonocnemis rufus n. sp. Fere opacus, latus, rufus, fere glaber ; capite in vertice tricarinato ; thorace subquadrato, lateraliter sinuato, ad basin depresso ; elytris latis, multicarinatis, intervallis punctatis, impressis. Long. 3 mill. Congo.

Allecula (Dictopsis) ambrensis n. sp. Nitidus, subparallelus, nigro-piceus, capite rufescente, antennis pedibusque rufo-testaceis ; thorace transverso, punctato plicatoque ; elytris crenato striatis, humeris prominulis, subrotundatis ; femoribus dilatatis. Long. 5 mill. Madagascar.

Peut se placer près de *A. brevicolles* Klug, coloration des pattes différente, etc.

Allecula (Dictopsis) minuta n. sp. Nitidus, subparallelus, rufus, pedibus testaceis, femoribus apice aliquod nigro notatis ; thorace subquadrato, densissime punctato ; elytris crenato-striatis, humeris prominulis, subrotundatis ; femoribus dilatatis. Long. 4 mill. Ile Banguey.

Très voisin du précédent, coloration plus claire, ponctuation crénelée des élytres plus profonde, etc.

Allecula multilineata n. sp. Opacus, oblongo-ovatus, subconvexus, rufo-testaceus, elytris multi nigro lineatis ; thorace subtransverso, antice attenuato, fortiter sat sparse punctato ; elytris punctato-striatis, intervallis irregularis, pro parte nigris ; femoribus validis. Long. 8 mill. Madagascar.

Voisin de *A. sugillata* Klug et distinct par les élytres ornés de nombreuses lignes noires étroites, de longueurs inégales.

Allecula innotatipennis n. sp. Subopacus, satis elongatus, apice attenuatus, rufo-testaceus ; thorace subtransverso, mediocre punctato ; elytris punctato-striatis ; femoribus validis. Long. 8 mill. Madagascar : Tananarive.

Très voisin du précédent, moins convexe, avec les interstries à peu près égaux, avec une coloration uniforme sur les élytres.

Allecula annulicornis n. sp. Subnitidus, oblongo-elongatus, rufus, capite antice pedibusque pallidioribus, antennis testaceis, brunneo annulatis ; thorace satis elongato, dense punctato ; elytris postice attenuatis, punctato striatis, humeris subrotundatis ; femoribus parum validis. Long. 11 mill. Zanzibar.

Diffère de *A. dentatipes* Pic par les élytres plus larges, les pattes moins robustes avec les tibias antérieurs simples, en outre de la coloration plus claire du dessus.

Allecula sansibarica n. sp. Nitidus, oblongo-elongatus, postice attenuatus, nigro-piceus, antennis pedibus, abdo-

mine elytrisque rufo-testaceis ; thorace subquadrato, densissime punctato ; elytris striato-punctatis, humeris prominulis ; femoribus dilatatis, tibiis anticis subarcuatis. Long. 13 mill. Zanzibar.

Diffère du précédent, en outre de la coloration foncée de l'avant-corps, par les élytres à épaules marquées et les pattes plus robustes.

Allecula sulcaticollis n. sp. Nitidus, elongatus, postice attenuatus, rufus, thorace in disco capiteque postice obscurioribus, antennis testaceis, nigro annulatis ; thorace subquadrato, in medio sulcato, fortiter sat dense punctato ; elytris striato-punctatis, humeris prominulis ; pedibus validis, tibiis anticis sinuatis. Long. 17 mill. Zanzibar.

Plus allongé que le précédent, avec le prothorax moins densément ponctué, les tibias antérieurs plus longs, sinués.

Allecula lucidicollis n. sp. Nitidus, supra rufus, infra antennisque nigris, pedibus nigris, femoribus ad basin late testaceis ; thorace breve, lateraliter subarquato, minutissime punctato ; elytris striato-punctatis, humeris satis prominulis ; femoribus dilatatis. Long. 13 mill. Zanzibar.

Espèce particulière, facilement distincte par la forme et la ponctuation presque nulle de son prothorax.

Allecula Raffrayi n. sp. Nitidus, subconvexus, antice posticeque attenuatus, rufo-brunneus ; thorace breve, antice subarcuato, fortiter et dense punctato ; elytris striato-punctatis, humeris subrotundatis ; femoribus validis. Long. 12 mill. Zanzibar (Raffray).

Cette espèce se distingue, à première vue, des précédentes par les élytres pas plus larges que le prothorax.

Allecula cinctipennis n. sp. Nitidus, elongatus, antice posticeque attenuatus, niger, elytris rufo-cinctis, capite antice et infra corpore pro parte rufescentibus, antennis testaceis, femoribus ad basin luteis, apice nigris, tibiis pro majore parte tarsisque rufescentibus ; thorace fere

quadrato, fortiter sat dense punctato ; elytris punctato-striatis, humeris prominulis ; pedibus satis validis, tibiis plus minusve arcuatis. Long. 12 mill. Chine : Yunnan.

A placer près de *A. arcuatipes* Frm. et distinct, à première vue, par les élytres étroitement bordés de roux et la coloration des pattes.

Allecula malaccana n. sp. Subnitidus, elongatus, antice posticeque attenuatus, nigro-piceus, antennis pedibusque testaceis ; thorace fere quadrato, fortiter et dense punctato ; elytris elongatis, punctato striatis, humeris prominulis ; pedibus longissimis. Long. 14 mill. Malacca : Perak.

Plus allongé que l'espèce précédente, avec les pattes concolores, bien plus longues ; d'ailleurs très distinct par ses cuisses très longues.

Allecula nigrocincta n. sp. Nitidus, oblongus, postice valde attenuatus, niger, elytris rufescentibus, nigro cinctis ; thorace subquadrato, fortiter et dense punctato ; elytris punctato-striatis, humeris subrotundatis ; pedibus satis validis. Long. 11 mill. Sumatra : Bedagei.

Cette espèce, très distincte par sa coloration élytrale, peut se placer près de *A. funesta* Mákl.

Allecula rufipennis n. sp. Nitidus, elongatus, postice valde attenuatus, nigro-piceus, elytris, tibiis tarsisque rufescentibus, antennis testaceis, ad basin nigris ; thorace transverso, fortiter et dense punctato, postice triimpresso ; elytris mediocre punctato-striatis, intervallis distincte punctatis, humeris prominulis ; pedibus satis validis. Long. 10 mill. Sumatra : Palembang.

Diffère du précédent par le prothorax plus transversal, les élytres moins fortement ponctués sur les stries, avec les intervalles à ponctuation marquée et assez forte.

Allecula bruneiensis n. sp. Nitidus, oblongo-ovatus, postice attenuatus, nigro-piceus, antennis, elytris abdomineque rufescentibus, pedibus validis, rufescentibus, femoribus nigro-piceis, ad medium luteis ; thorace subquadrato,

fortiter et dense punctato ; elytris leviter punctato-striatis, intervallis satis latis, multi punctatis, humeris prominulis. Long. 15 mill. Bornéo : Brunei.

Voisin de *A. annulata* Makl., plus grand et de coloration plus claire.

Allecula obscuripes n. sp. Nitidus, oblongo-ovatus, antice et postice attenuatus, niger ; thorace subtransverso, minute et sparse punctato ; elytris punctato-striatis, intervallis satis latis, humeris rotundatis ; pedibus validis. Long. 13 mill. Sumatra.

Très distinct, à première vue, de l'espèce précédente par les épaules effacées et la coloration plus foncée.

Allecula borneensis n. sp. Nitidus, satis elongatus, antice et postice attenuatus, niger ; thorace subtransverso, fortiter sat sparse punctato ; elytris punctato-striatis, intervallis satis latis, humeris subrotundatis ; pedibus satis validis. Long. 12 mill. Bornéo.

Très voisin du précédent, forme un peu plus allongée, épaules arrondies mais non effacées en avant, tête à peine impressionnée devant les yeux, etc.

Allecula subopaca n. sp. Subopacus, elongatus, postice attenuatus, niger ; thorace subquadrato, minute et sparse punctato ; elytris punctato-striatis, humeris subrotundatis ; pedibus satis elongatis, femoribus anticis mediocre dilatatis. Long. 15-16 mill. Java.

Cette espèce, par son dessus presque mat à reflets soyeux, est très distincte entre toutes celles qui précèdent. Peut se placer près de *A. cuneipennis* Frm.

Allecula Alberti n. sp. Satis nitidus, oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, nigro-piceus, antennis pedibusque testaceis, femoribus apice breve nigro notatis ; thorace subquadrato, antice subrotundato, fortiter et dense punctato ; elytris striato-punctatis, postmedium minute dilatatis et postice valde attenuatis, humeris prominulis, rotundatis ; pedibus validis. Long. 11 mill. Congo français : Fort-Sibut.

Voisin de *A. poplitis* Frm., moins robuste et coloration différente, pattes nettement bicolores.

Dédié à S. M. Albert I^er^, comme humble hommage rendu à son admirable énergie et à son remarquable esprit scientifique.

Allecula elongata n. sp. Nitidus, elongatus, antice et postice attenuatus, nigro-piceus, elytris apice brunnescentibus, labro, antennis pedibusque testaceis, femoribus apice nigro notatis ; thorace satis elongato, antice attenuato, sat fortiter et dense punctato ; elytris mediocre punctato-striatis, humeris prominulis, subrotundatis ; pedibus satis elongatis, femoribus subcrassatis, tibiis anticis subarcuatis. Long. 13 mill. Brésil.

Paraît voisin de *A. depressa* Champ. et en différer par la forme plus étroite et la coloration.

Allecula subænea n. sp. Elongatus, antice mediocre et postice valde attenuatus, nigro-æneus, pedibus nigris aut brunneis, femoribus ad basin late testaceis ; thorace subopaco, subtransverso, densissime punctato ; elytris nitidis, mediocre striato-punctatis, humeris prominulis, subrotundatis ; pedibus satis validis. Long. 10 mill. Bolivie : Chaco.

Espèce très distincte par sa coloration ; peut se placer près de la précédente.

Allecula Baeri n. sp. Subnitidus, oblongo-elongatus, postice valde attenuatus, niger, antennis ad basin tarsisque rufescentibus ; thorace subquadrato, fortiter sat dense punctato ; elytris punctato-striatis, humeris prominulis, distincte rotundatis ; femoribus validis. Long. 11 mill. République Argentine : Tapia (ex Baer).

Sans doute voisin de *A. cribricollis* Frm. et distinct, à première vue, au moins par sa coloration plus foncée.

Bolbostetha longicornis n. sp. Satis nitidus, oblongo-elongatus, nigro-piceus, antennis tibiisque pro parte rufescentibus ; antennis longis ; thorace subquadrato, fortiter et dense punctato ; elytris crenato-striatis, apice

valde attenuatis, humeris prominulis, subrotundatis ; pedibus validis, tibiis anticis dilatatis. Long. 10 mill. Malacca : Perack.

Diffère de *B. soleata* Frm. (ex-description) par la forme peu allongée et la coloration.

Synallecula longipennis n. sp. Nitidus, elongatus, niger, aut brunneo-piceus, thorace, scutello elytrisque rufis, femoribus ad basin testaceis ; thorace fortiter et sparse punctato ; elytris longissimis, striatis et punctato lineatis. Long. 8 mill. Congo français : Fort-Sibut.

Très distinct de *S. livida* Sahl. par les élytres plus allongés et la ponctuation écartée du prothorax.

Pseudocistela bilineaticollis n. sp. Nitidus, satis elongatus, antice et postice attenuatus, testaceus, elytris pallidioribus, ad suturam antice et lateraliter anguste nigro cinctis, thorace in disco nigro bilineato. Long. 7 mill. Madagascar : Annanarive.

A placer près de *P. vagevittata* Frm., tête concolore, prothorax orné de deux bandes foncées subarquées, etc.

Pseudocistela lineata n. sp. Subnitidus, oblongus, rufotestaceus, thorace trilineato elytrisque quadrilineatis, lineis nigro-æneis, vittis media et externa abbreviatis, infra corpore pro parte obscuro. Long. 6 mill. Madagascar.

Voisin de *P. subvittata* Frm., mais prothorax avec une ligne médiane foncée, suture et bord des élytres non foncés, avec plusieurs bandes discales d'un noir bronzé.

Pseudocistela rufescens n. sp. Nitidus, satis elongatus, antice et postice attenuatus, rufus, elytris in disco et antice plus minusve nigro-piceis, minute et sparse punctatis, ad suturam unistriatis. Long. 6-7 mill. Madagascar.

Voisin du précédent, en diffère par sa forme plus déprimée, le prothorax plus rétréci en avant, la coloration presque uniforme, etc.

Isomira atricolor n. sp. Subnitidus, griseo pubescens, niger, densissime rugoso-punctatus, elytris in disco substriatis. Long. 4 mill. Madagascar : Annanarive.

Voisin de *I. morosa* Frm., mais élytres, quoique faiblement, multistriés sur leur milieu et pattes franchement noires.

Cistelampra pallidipennis n. sp. Subnitidus, oblongus, testaceus, elytris pallidioribus, antennis ad basin femoribus apice abdomineque postice nigris ; thorace transverso, alutaceo et sparse punctato ; elytris striato-punctatis, humeris prominulis, subrotundatis. Long. 7 mill. Madagascar.

Paraît différer de *C. purpurina* Frm. au moins par la coloration du corps et celle des pattes.

Colobapsis brunneonotatus n. sp. Satis nitidus, supra testaceus, capite postice et thorace in disco brunneo notatis, infra corpore pro majore parte, antennis pedibusque nigris ; thorace transverso, lateraliter sinuato, postice valde dentato ; elytris lateraliter subsinuatis, satis elongatis, sat fortiter et sparse punctatis ; pedibus validis, tibiis arcuatis. Long. 13 mill. Côte d'Ivoire.

Voisin de *C. rustica* Weise, prothorax à macules plus larges et brunes, pattes plus foncées, etc.

Pœcilomorpha abyssinica n. sp. Nitidus, niger, capite thoraceque breve et elytris late luteo notatis, antennis, tibiis tarsisque testaceis ; capite thoraceque mediocre et sparse punctatis ; elytris brevibus, postice attenuatis, fortiter punctatis, ad basin et ad apicem luteo maculatis et ante medium luteo fasciatis ; pedibus validis. Variat elytris testaceis, nigro maculatis (var. *nigronotata*). Long. 10-12 mill. Abyssinie.

Peut se placer près de *P. gentilis* Pering., dont il se distingue, à première vue, par la coloration tout autre.

TABLE

POUR LE DOUZIÈME FASCICULE

	Pages.
Introduction	1
Descriptions abrégées diverses.	3